COUPE GENERALE DES ANDES PERUVIENNES (entre 9° Sud et 11° Sud)

B. DALMAYRAC (1)

Resumen. Perfil geológico general de los Andes peruanos (entre 9° Sur y 11° Sur). El estudio de una sección de los Andes centrales del Perú demuestra que la cadena de los Andes se ha constituido durante tres orógenos:

- 1) Un orógeno precámbrico, con una tectónica polifásica acompañada de un metamorfismo de baja presión y que aflora ampliamente en la Cordillera Oriental, constituye el substrato de los edificios hercínicos y andinos.
- 2) La cadena hercínica aflora en la parte occidental de la Cordillera Oriental. En la sección estudiada el material paleozóico constituye el borde oriental del edificio hercínico. La cadena hercínica se constituyó durante dos fases de plegamientos:

—una fase eohercínica, bien marcada, caracterizada por pliegues parados, cilíndricos, de rumbo N 130°, acompañados de una esquistosidad de fractura. El conjunto constituye un amplio anticlinorium con plano axial vertical;

—una fase tardihercínica, poco desarrollada sobre esta transversal, se caracteriza por una tectónica por fallamiento.

Su posición entre dos bloques precámbricos y el estilo general de las estructuras sugieren su posición intracratónica.

- 3) La cadena andina, oblicua respecto a la cadena hercínica, es el resultado de la evolución de dos cuencas epicontinentales, una al Oeste, la otra al Este. La cadena andina está caracterizada por un estilo tectónico cuya intensidad crece desde la costa hasta la parte central donde aflora el nivel estructural inferior para luego disminuir brutalmente en la zona subandina. Una tectónica polifásica ha dado pliegues con planos axiales verticales o en abánico y acompañados de una esquistosidad de fractura.

Las estructuras las más evidentes son debidas a fases de compresión separadas por largos períodos durante los cuáles los fenómenos de distensión son importantes.

La cadena andina se ha desarrollado de forma simétrica sobre un antiguo continente hercínico-precámbrico; sola la existencia de fallas inversas en el flanco oriental de la Cordillera Oriental indicaría una cierta asimetría, con hechamiento hacia el NE.

La cadena andina debe ser considerada como una cadena intracratónica, ubicada en el borde del continente suramericano.

(1) Chargé de Recherches O.R.S.T.O.M. 24, rue Bayard — Paris 8eme. — FRANCE.

Le matériel qui compose la Cordillère des Andes péruviennes a été affecté par, au moins, trois orogènes différentes:

- orogénese précambrienne,
- orogénese hercynienne,
- orogénese andine.

Contrairement aux idées généralement admises, nous ne pensons pas que ces orogènes se soient juxtaposés parallèlement sur la bordure du continent sud-américain, répondant ainsi au schéma classique de "l'accrétion continentale". Les travaux actuels permettent plutôt de penser que ces orogènes se sont superposés obliquement.

La chaîne hercynienne s'est développée sur un vieux continent précambrien. La chaîne andine, oblique par rapport à la chaîne hercynienne, s'est également constituée sur un ancien continent précambrien-paléozoïque.

Nous étudierons successivement ces trois orogènes sur une coupe généralisée des Andes Centrales (entre les parallèles 9° et 11° Sud).

L'OROGENESE PRECAMBRIENNE

Sur la transversale étudiée, entre Huánuco et la bordure Est de la Cordillère Orientale, n'affleurent que des terrains précambriens. Légèrement plus au Nord ils sont très largement représentés dans la vallée du Marañón et constituent l'essentiel des affleurements de la Cordillère Orientale.

Le Précambrien comporte une série détritique très épaisse, avec de rares intercalations carbonatées et une série volcano-sédimentaire tufassée. Ces terrains sont affectés par une tectonique polyphasée (Dalmayrac 1970) et un métamorphisme général d'intensité variable, allant de l'anchizone au faciès "amphibolite" profond.

Dans la partie Ouest de la Cordillère orientale, entre Yanahuanca et Parcoy affleure une série azoïque très épaisse (2.000 à 3.000 m.) constituée de conglomérats, de quartzites et de schistes noirs, généralement peu métamorphique. Localement apparaît un début de métamorphisme pouvant atteindre l'isograde de la biotite.

Une étude microtectonique de cette zone nous a permis de mettre en évidence l'existence d'une série inverse sur environ 20 km. associée à une schistosité subhorizontale. On serait donc en présence de grands plis couchés déversés vers le N.E.

L'ensemble a été replissé lors des phases postérieures, probablement andines, pour donner de grandes structures anticlinales et synclinales actuellement les plus visibles.

Ces terrains étaient considérés par les auteurs antérieurs comme d'âge paléozoïque indifférencié.

Il existe une très grande différence tant dans les faciès et l'épaisseur que dans le style tectonique, entre cette série et les terrains paléozoïques inférieurs bien datés qui affleurent à l'Est de Parcoy. Pour cette raison il nous semble plus logique de considérer que ces terrains appartiennent à l'anchi-

zone précambrien, c'est à dire à la zone la plus supérieure non affectée par le métamorphisme.

Légerement plus à l'Est, entre Parcoy et Huánuco, et plus au Nord (vallée du Marañon), affleure essentiellement le facies "schistes verts" (schistes à chlorite, séricite, prasinite), mais localement on observe le début du facies "amphibolite" (isograde de la biotite). Dans la zone Est, entre Huánuco et Tingo María, les isogrades ont été plissés lors des déformations hercyniennes et plus probablement andines. Le facies "amphibolite" profond (muscovite, biotite, grenat, staurotide, andalousite, cordiérite, sillimanite) y affleure en deux zones anticlinales au sein du facies "schistes verts".

Associé à cet ensemble, on trouve un cortège de roches basiques et ultrabasiques (péridotites, serpentinites...), préorogéniques, ainsi que des massifs granitiques peu ou pas déformés (Ouest de Tingo María et région de Huánuco), certainement contemporains ou légèrement postérieurs au métamorphisme régional.

Ce complexe métamorphique précambrien se retrouve dans de nombreuses zones de la Cordillère Orientale péruvienne et constitue aussi, à partir de 14° Sud, sur la cote péruvienne, une large bande recouverte localement en discordance par des terrains paléozoïques peu plissée.

De façon générale, il existe une grande similitude dans le matériel, dans les déformations tectoniques et dans le métamorphisme de ces terrains précambriens. D'après les premiers résultats, le métamorphisme de la chaîne précambrienne du Pérou est de type intermédiaire de basse pression pour lequel un âge baikalien (600 à 500 M.A.) peut être envisagé. (Audebaud et al. 1971).

Ce Précambrien constitue le substratum des chaînes hercynienne et andine.

OROGENESE HERCYNIENNE

Une publication antérieure (F. Mégard et al. 1971) montre que la chaîne hercynienne affleure essentiellement dans la Cordillère Orientale des Andes et constitue à l'Ouest le substratum de la chaîne andine comme en témoignent quelques affleurements sur la cote sud péruvienne.

Dans la chaîne hercynienne ainsi caractérisée, deux phases de déformations sont connues:

la première éohercynienne d'âge dévonien supérieur-carbonifère inférieur, la seconde tardihercynienne, d'âge permien moyen.

I — LE MATERIEL PLISSE HERCYNIEN:

Sur la coupe étudiée, le matériel hercynien est caractérisé par un Paléozoïque inférieur marin peu développé (500 à 1000 m.) et un Paléozoïque supérieur néritique et continental pouvant atteindre 2.000 m.; l'ensemble est recouvert transgressivement par des molasses continentales rouges d'âge permien supérieur et d'épaisseur très variable (200 à 2.000 m.).

Le Paléozoïque inférieur: les sédiments d'âge ordovicien sont les seuls connus; ce sont des lutites parfois gréseuses contenant des graptolites du

Llanvirnien (Lemon et Granswick 1956). L'ensemble de cette série est peu épais comparé à l'Ordovicien du Sud du Pérou et repose en discordance angulaire nette sur le Précambrien (Dalmayrac B. 1970). Le Cambrien et l'Ordovicien inférieur (Trémadoc, Arénig) ne sont pas représentés. Dans la zone sub-andine ($7^{\circ}20'S$ — $75^{\circ}W$) affleurent des schistes Eampéltiques à graptolithes également d'âge llanvirnien (Newell et Tafur 1943), au coeur d'un grand anticlinal NW-SE d'âge tertiaire. On ne connaît pas de sédiments d'âge siluro-dévonien dans cette région. Il est vraisemblable que le Dévonien décrit par Steinmann (1930 p. 22) près de Huánuco, corresponde au Mississipien marin (Dalmayrac B. 1970).

Le Paléozoïque supérieur est bien représenté. Il débute par le Mississipien constitué par une série continentale avec intercalations marines. Il repose, par l'intermédiaire d'un conglomérat de base, en discordance angulaire nette sur l'Ordovicien ou le Précambrien. En concordance sur les gres et quartzites de ce Mississipien on trouve des calcaires marins du Permien inférieur.

Une épaisse série de molasses rouges associées à des roches volcaniques andésitiques à rhyolitiques d'âge permien supérieur recouvre transgressivement tous les termes antérieurs.

II — LA TECTONIQUE HERCYNIENNE:

Des deux phases tectoniques connues dans la chaîne hercynienne au Pérou, seul le plissement Éohercynien est bien caractérisé sur cette transversale; la phase tardihercynienne ne se manifeste que par des mouvements verticaux.

α) Les structures hercyniennes:

— Les déformations éohercyniennes: Les structures éohercyniennes sont mises en évidence dans la Cordillère Orientale par la discordance angulaire de l'ensemble Carbonifère-Permien sur l'Ordovicien inférieur plissé.

Les plis sont souples, à plan axial subvertical, accompagnés de schistosité. Ce sont généralement des plis décamétriques accompagnés de microplis. Les plis sont anisopaques dans les niveaux pélitiques ou on observe une schistosité de fracture très fine qui passe parfois à un début de schistosité de flux. La schistosité de plan axial des plis, dessine des éventails plus ou moins ouverts; son pendage est presque toujours proche de la verticale et on n'observe pas de déversement préférentiel.

Les axes de plis et de microplis, le plan de schistosité ainsi que la linéation d'intersection ont une direction N. 130° .

Des failles normales postérieures, de direction N-S, ont permis l'individualisation de compartiments dans lesquels le Carbonifère discordant s'est déposé soit sur le Paléozoïque inférieur soit directement sur le socle précambrien.

Dans la zone subandine (région de Contaya extrémité Est de la coupe), les terrains paléozoïques sont peu ou pas plissés et on ne connaît pas de discordance.

— **les déformations tardihercyniennes:** Au Permien moyen un soulèvement général provoque le retrait de la mer. Les molasses rouges volcano-sédimentaires du Permien supérieur (groupe Mitu), se déposent alors sur des niveaux très variés. Ainsi, sur notre coupe, entre Ambo et Parcoy, le Permien supérieur est concordant sur les niveaux marins du Permien moyen. Par contre, à l'Ouest de la faille de Parcoy, et légèrement plus au Nord, dans la région de Chavinillo, les molasses rouges reposent en discordance angulaire, directement sur le substratum précambrien.

La surrection générale précédant le dépôt de ces molasses est certainement associée à une phase de distension se traduisant par un bombement d'ensemble de la région et par le jeu de nombreuses failles parallèles à la chaîne qui ont permis la montée du matériel volcanique du Permien supérieur.

b) Le métamorphisme et le magmatisme hercynien:

Les terrains du Paléozoïque inférieur sont localement affectés par un épimétamorphisme (ardoises). On observe alors les minéraux de métamorphisme orientés suivant les plans de schistosité de la phase éohercynienne. Une reprise du matériel précambrien par le métamorphisme hercynien n'est pas encore prouvée d'une façon certaine. Le magmatisme, encore mal connu, est relativement réduit.

III — CONCLUSION:

Si on compare le segment hercynien sur notre transversale avec la Cordillère Orientale du Sud péruvien (Mégard et al. 1971), on constate qu'il existe une grande différence, tant au point de vue stratigraphique (réduction des séries) qu'au point de vue tectonique (plis simples avec schistosité de fracture).

Cette différence est due au fait que sur la transversale de Huánuco, les affleurements paléozoïques de la Cordillère Orientale ne correspondent pas à l'axe même de la chaîne mais à sa bordure orientale.

Ce caractère se précise plus au Nord, dans la région de Patatz ($77^{\circ}30'W$ $7^{\circ}30'S$) où le contact Ordovicien-Mississippien est sub-parallèle (Wilson et Reyes 1964).

Compte tenu de ces diverses observations, nous pensons donc que l'axe de la chaîne hercynienne oblique à la direction andine devrait se situer plus à l'Ouest de la zone de Huánuco, sous le matériel mésozoïque constituant la Cordillère Occidentale.

L'OROGENESE ANDINE

L'ensemble orogénique andin se répartit en deux zones stratigraphiquement et tectoniquement différentes séparées par la Cordillère Orientale:

— A l'Ouest, dans la Cordillere Occidentale, un cycle orogénique polyphasé affecte des séries mésozoïques, soit marines soit continentales. La tectonique andine reprend les orogènes précambriens et hercyniens de la Cordillere orientale.

— A l'Est de la Cordillere Orientale, dans la zone sub-andine, une phase d'âge tertiaire supérieur affecte des terrains concordants depuis l'Ordovicien.

I — LE DOMAINE ANDIN OCCIDENTAL ET LA CORDILLERE ORIENTALE

1) Le matériel:

Après la pénéplanation de la chaîne hercynienne, se constitue un bassin de sédimentation de direction NW-SE, dans lequel deux zones se différencient de l'Ouest vers l'Est. Au niveau de la cote actuelle une zone essentiellement volcanique sépare le Pacifique d'un bassin subsident à sédimentation épicontinentale limité à l'Est par la Cordillère Orientale qui constituait une zone émergée durant le Mésozoïque.

a) **La zone cotière** (zone entre Huacho et Sayán-Churín). Sur la cote centrale du Pérou on ne connaît aucun terrain du Trias au Jurassique. Cependant, il est probable, si l'on tient compte des sédiments connus sur la cote Sud et sur la cote Nord, que d'épaisses séries volcano-sédimentaires détritiques de cet âge se déposèrent également sur la zone cotière centrale. Durant le Crétacé inférieur se dépose une épaisse série volcano-sédimentaire (formation Casma) où dominent les coulées volcaniques de composition andésitique et dacitique, présentant parfois des structures en pilow-lavas. Il est généralement admis que cette série est d'âge albien supérieur à cénomarien inférieur.

Reposant en discordance angulaire sur ces terrains on trouve une autre série volcanique appelée "volcanisme Calipuy" (Cossio A. 1964). Cette série très épaisse (2.000 m.) et très étendue est constituée de coulées volcaniques pyroclastiques de composition andésitique, dacitique et rhyolitique, intercalées avec des grès fins rougeâtres et quelques conglomérats. Elle repose en discordance angulaire sur les "couches rouges" d'âge crétacé supérieur-éocène et serait donc postérieure aux deux premières phases du plissement andin. En conséquence, on lui attribue un âge mio-pliocène. Enfin, cet ensemble est lui-même recouvert par un volcanisme ignimbritique non plissé du Pliocène supérieur.

Conclusion: durant tout le Mésozoïque a régné sur la bordure occidentale du domaine andin une importante activité volcanique. Nous pensons que le schéma proposé par Wilson est toujours valable et que cette zone doit être considérée comme une guirlande d'îles volcaniques a activité essentiellement explosive parfois aérienne, parfois sous-marine qui s'allongeait en bordure du bassin subsident andin.

b) **Le bassin andin épi-continental et la Cordillère Orientale.** Après la pénéplation de la chaîne hercynienne, une transgression marine détermine la formation d'un bassin épi-continental subsident de direction N.NW-S.SE. Ce bassin, ouvert aux influences pacifiques, est limité à l'Est par la Cordillère Orientale émergée qui formait une zone positive.

La grande invasion marine débute au Carnien et se poursuit jusqu'au Lias supérieur. La transgression se fait sans discordance angulaire sur les molasses du Permien supérieur. Dans la partie orientale de ce bassin se dépose une importante série carbonatée (groupe Pucará) de l'ordre de 1.500 m. d'épaisseur, alors que plus à l'Est, dans la Cordillère Orientale, la série est plus condensée (400 à 500 m.). Durant le Jurassique moyen et supérieur l'allure du bassin est encore mal connue. Au Tithonique, dans la partie occidentale, se dépose une épaisse série (1.000 à 1.500 m.) de grés fins et de lutites noires (formation Chicama). On ne connaît pas de séries analogues dans la partie orientale où les sédiments classiques du Crétacé inférieur reposent directement sur les calcaires du Lias. Il semble donc probable qu'à partir du Jurassique se soient différenciées une zone de plateforme faisant suite à la Cordillère Orientale émergée et une zone plus subsidente à l'Ouest où se sont déposés des faciés marins plus profonds. Ce dispositif paléogéographique va continuer à conditionner la sédimentation jusqu'au Sénonien. Durant le Néocomien-Aptien se dépose une série essentiellement détritique dans laquelle on peut différencier deux faciés: un faciés oriental (deltaïque à continental, peu épais, correspondant à la zone de plateforme (groupe Goyllarisquizga) et un faciés occidental, marin, plus épais. Une importante transgression marine se produit à l'Albien-Cénomaniens; la mer recouvre des régions jusqu'alors émergées et dépose une série carbonatée qui se poursuit dans le centre du Pérou jusqu'à la fin du Sénonien.

Vers la fin du Sénonien, un soulèvement contemporain de la première phase de plissement provoque le retrait de la mer de la plus grande partie des Andes péruviennes; il se dépose alors une série détritique rouge formée de grés et de conglomérats avec de rares intercalations marines ("couches rouges"). Cette sédimentation détritique se poursuit jusqu'à l'Eocène moyen ou supérieur.

La phase paroxysmale andine (Eocène supérieur-Oligocène inférieur) affecte l'ensemble des séries et est suivie par un dépôt d'importantes venues volcaniques, pyroclastiques, andésitiques, intercalées avec quelques niveaux de grés fins et de conglomérats. Ce volcanisme attribué au Mio-Pliocène atteint 3.000 mètres d'épaisseur. Postérieurement à la dernière phase de plissement on note une importante activité volcanique de composition ignimbrétique ou rhyolitique.

II LA TECTONIQUE ANDINE:

a) **Les différentes phases tectoniques; leur âge:** En général on différencie trois épisodes dans l'évolution tectonique andine:

— une phase fini-crétacée (probablement fin-sénonien). Elle se manifeste dans certaines régions du Pérou par des mouvements de faible intensité donnant des zones plissées, orientées NW-SE, entre lesquelles subsistent des bassins non plissés. Cette première phase marque surtout la fin de la sédimentation marine et est suivie par le dépôt de faciés continentaux ("couches rouges") localement discordants.

— une phase majeure qui se situe dans l'intervalle éocène supérieur-oligocène inférieur, affecte l'ensemble du domaine andin occidental et se traduit suivant les régions par un plissement plus ou moins intense de direction NW-SE.

— une phase pliocène qui replisse mollement les séries volcaniques andésitiques. Cette dernière phase a été suivie d'une pénéplanation générale donnant une importante surface d'érosion dite "surface Puna" qui a dû s'établir au début du Pliocène. Cette surface d'érosion a été fragmentée par de nombreuses failles et l'ensemble a été soulevé de plusieurs milliers de mètres au cours du Quaternaire.

Remarque: En pratique, il est très difficile de différencier sur cette coupe la phase fini-crétacée de la phase majeure; en effet, ceci n'est possible que lorsqu'on peut observer les "couches rouges" discordantes sur les structures de la première phase et plissées au cours de la phase majeure.

Pour cette raison, par la suite, nous parlerons de structures andines sans pouvoir préciser si celles-ci sont de la première ou de la deuxième phase.

b) **Les structures:** Les différentes structures correspondant aux trois phases de déformations ont généralement la même orientation N.NW-S. SE (N. 150°).

Sur la section étudiée on peut distinguer, du Pacifique vers la Cordillère Orientale, quatre unités structurales:

- la zone côtière,
- la zone centrale,
- la bordure Est de la Cordillère Occidentale.
- la Cordillère Orientale.

— La zone côtière:

Sur la côte, entre Huacho et Sayan-Churin, les séries volcano-sédimentaires sont affectées par une tectonique peu intense. On observe généralement des plis concentriques à grand rayon de courbure; à plan axiaux toujours redressés; les chevauchements sont absents et, sur la coupe étudiée, la schistosité n'est jamais présente, excepté dans la partie située en-

tre Sayan et Churin ou existe une schistosité de fracture tres grossiere limitée a quelques couloirs. Plus au Sud (region de Lima, Santa María) la schistosité est bien marquée. Il faut signaler un tres grand nombre de filons basiques qui recourent les séries volcano-sédimentaires du Mésozoïque ainsi que le batholite cotier. Cette zone a tectonique simple est oblitérée vers l'Est par l'intrusion du batholite.

— La zone centrale:

A l'Est du batholite cotier, (entre Churin et Oyon), le style tectonique change dans une bande de plusieurs kilometres de large qui se suit sur plus de cent kilometres et qui est localisée au centre et au Nord du Pérou. Les terrains mésozoïques sont affectés par un plissement tres intense qui donne des plis "en chevrons" aigus, hectométriques; a ces méga-structures sont associés de nombreux replis (drag-folds) de type semblable. Ces plis sont accompagnés d'une schistosité de fracture bien développée dans les niveaux tendres. La schistosité, plan-axial des structures, est subverticale ou disposée en éventail de part et d'autre du plan axial des plis et présentant des réfractions dans les bancs compétents. Dans les niveaux pélitiques fins (formation Chicama) du Trias-Jurassique, cette schistosité est tres fine; les microlitons y sont inférieurs au millimetre; par contre, dans les niveaux calcaires, elle est beaucoup plus grossiere, l'intersection schistosité-stratification donnant alors un débit parallélépipédique qui, en section, peut donner l'apparence de nodules.

On n'observe jamais de déversement préférentiel.

— La bordure Est de la Cordillere Occidentale:

A l'Est de la zone a schistosité bien développée fait suite une bande de quelques kilometres de large, caractérisée par des chevauchements vers le NE, accompagnés de plis également déversés vers le NE. La schistosité se manifeste dans les niveaux inférieurs plus plastiques, par contre elle est absente dans les niveaux calcaires du Crétacé supérieur. Cette zone a chevauchements semble correspondre a la ligne de changement de facies entre le bassin occidental et la plateforme continentale orientale; elle est tres localisée et se poursuit, au Nord et au Sud de la section étudiée, sur plus de 100 km.

A l'Est de la zone de chevauchement (Region de Yanahuanca), on trouve encore des plis légèrement déversés vers le NE, puis, progressivement, le style tectonique change pour donner des plis concentriques a grand rayon de courbure accompagnés de failles inverses tres redressées. La schistosité, moins marquée que dans la zone centrale, est encore présente mais tend a disparaître lorsqu'on aborde la Cordillere Orientale.

— La tectonique andine dans la Cordillere Orientale:

Les terrains du Paléozoïque supérieur affleurant dans la Cordillere Orientale sont plissés tout comme quelques lambeaux de calcaire triasico-

liasique, en de vastes anticlinaux et synclinaux de direction N.NW — S.SE. Une schistosité de fracture peu marquée, toujours subverticale et parallèle au plan axial des grandes structures affecte les grés-pélites du Carbonifère et parfois les molasses rouges permienne. Il est donc logique d'attribuer ces plis et cette schistosité à la tectonique andine.

Enfin, plus à l'Est, sur le versant amazonien de la Cordillère Orientale, lors de la tectonique andine, les niveaux plus profonds du Paléozoïque inférieur et du Précambrien ont été soit repris dans de vastes structures replissant les schistosités antérieures, soit affectés par une tectonique de failles inverses. Ces failles ont pu jouer ultérieurement en décrochements comme en témoignent les nombreuses stries horizontales que nous avons observées. Une de ces grandes failles inverses limite à l'Est la Cordillère orientale, faisant chevaucher les terrains précambriens sur les sédiments mésozoïques du bassin subandin.

Sur la transversale Huánuco — Tingo María, dans les schistes verts apparaissent des grands domes de roches à "facies amphibolite"; nous pensons que la tectonique andine est responsable de la formation de ces domes.

Conclusion

Le style tectonique de la chaîne andine se caractérise par:

- la présence de plis à plans axiaux verticaux,
- l'existence d'une schistosité de fracture, parallèle au plan axial de ces plis et également subverticale,
- l'intensité de la déformation qui se traduit par des plis en chevrons ou des plis semblables,
- l'absence de déversement préférentiel,
- la symétrie, marquée par une zone centrale fortement tectonisée séparant deux zones à plissement moins intense.

La présence de schistosité, comme l'intensité de la déformation, nous permettent de préciser qu'au moins dans la partie centrale de la chaîne les caractéristiques du plissement correspondraient à celles de la partie supérieure du niveau structural inférieur.

Dans ces conditions, il nous paraît difficile d'accepter que des structures généralement verticales ou disposées symétriquement en éventail, puissent être provoquées par une tectonique de gravité superficielle (J.J. WILSON et L. REYES, 1964). Nous pensons que les structures décrites sont le résultat de mouvements de compression.

Le raccourcissement est difficilement évaluable, des mouvements postérieurs de distension ayant perturbé les effets de la seule compression. Cependant, étant donné le style tectonique général, il semble raisonnable d'admettre qu'il doit être de l'ordre de 30%.

Enfin, bien que cela ne soit pas très visible sur cette coupe, d'autres observations au Sud et au Nord du Pérou permettent de dire que la chaîne andine, de direction N. 150° s'est superposée obliquement à la chaîne hercynienne qui a une direction moyenne N. 120°.

III — LE MAGMATISME INTRUSIF ANDIN

Il est essentiellement localisé sur la cote et dans la Cordillere Orientale.

Le batholite cotier, large d'environ 50 km., se poursuit sur plus de 1800 km. Il s'agit d'un ensemble intrusif complexe, constitué de tonalites, de granites, de diorites et principalement de granodiorites. Il semble s'être mis en place au cours de plusieurs phases d'intrusions allant du Crétacé inférieur au Tertiaire inférieur. Il serait donc anté ou syntectonique.

Dans la Cordillere Orientale on connaît également de nombreux massifs intrusifs. (2)

LA ZONE SUBANDINE

Entre la Cordillere Orientale à l'Ouest et la plateforme du Bouclier brésilien à l'Est, la zone subandine dont l'évolution sédimentologique et tectonique est très différente du "domaine andin occidental", peut être également considérée comme une chaîne intracratonique d'âge tertiaire.

I — LE MATERIEL

La sédimentation marine ou continentale est continue depuis le Paléozoïque inférieur jusqu'au Cénozoïque. Le seul affleurement de terrains paléozoïques est celui de Contaya situé au Nord de notre coupe. Au cœur d'un vaste anticlinal tertiaire orienté NW — SE, affleurent des schistes à graptolithes d'âge ordovicien moyen (Llanvirnien), faiblement plissés et recouverts en légère discordance angulaire par le Crétacé. Le Paléozoïque supérieur, en partie marin, est moins développé que dans la Cordillere Orientale et localement repose en concordance sur le Paléozoïque inférieur. Il tend jusqu'au rio Madre de Dios (Sud du Pérou). Du Jurassique moyen au Néocomien, se dépose une épaisse série continentale qui se termine au Crétacé supérieur, accompagnée de rares intercalations marines. Le Cénozoïque est marqué par une sédimentation continentale donnant des couches rouges avec quelques intercalations marines miocènes.

Les différentes phases tectoniques, bien caractérisées dans la Cordillere Occidentale ne se manifestent dans la zone subandine que par des lacunes, des changements de facies ou de très légères discordances.

(2) Une étude en cours, réalisée dans le cadre de la R.C.P. 132 du C.N.R.S., nous permettra de préciser de nombreux problèmes relatifs à ces intrusifs et principalement leur âge. D'après les premières études de terrain il semble qu'on puisse différencier dans cette région des intrusions précambriennes, hercyniennes et certainement pour la majeure partie andines. Ces dernières ont provoqué un important métamorphisme de contact accompagné de minéralisations.

II — LA TECTONIQUE

Une seule phase de plissement d'âge post-Miocène, peut-être du début du Pliocène, affecte toute la zone subandine. Elle se caractérise par des plis concentriques, parfois étroits et pouvant se prolonger sur des centaines de kilomètres. Ces structures parfois déversées vers le NE, souvent accompagnées de failles inverses sont fréquentes dans la partie Ouest de la zone subandine. Cette tectonique s'amortit rapidement vers l'E ou on passe à des plis concentriques à grand rayon de courbure, on rencontre ensuite une nouvelle zone de failles inverses après quoi la tectonique s'amortit à nouveau. Dans toute la zone subandine, (Ham et Herrera, 1963) on ne connaît pas de schistosité.

Vers l'Est les dernières structures sont ensevelies sous les sédiments horizontaux plio-quadernaires et, à la frontière entre la Pérou et le Brésil, existe une nouvelle zone de failles inverses qui localement fait chevaucher le socle précambrien sur les sédiments tertiaires.

CONCLUSIONS

L'étude de cette coupe des Andes péruviennes permet de constater que la chaîne des Andes s'est constituée au cours de trois orogénèses.

a) Un orogène précambrien, à tectonique polyphasée accompagnée d'un métamorphisme de basse pression et affleurant largement dans la Cordillère orientale, constitue le soubassement des édifices hercynien et andin.

b) La chaîne hercynienne affleure dans la partie ouest de la Cordillère Orientale. Sur la coupe étudiée elle constitue la bordure orientale de l'édifice hercynien.

Elle s'est formée au cours de deux phases:

— une phase échercynienne bien marquée, caractérisée par des plis droits, cylindriques, de direction N. 130°, accompagnés d'une schistosité de fracture. L'ensemble constitue un vaste anticlinorium à plan axial vertical.

— une phase tardihercynienne peu marquée au niveau de cette transversale, se caractérise par une tectonique cassante.

Comme nous l'avons déjà signalé (Mégard et al. 1971), sa position entre deux blocs précambriens et le style général des structures suggèrent que la chaîne hercynienne serait de type intracratonique.

c) La chaîne andine, oblique par rapport à la chaîne hercynienne est le résultat de l'évolution de deux bassins épicontinentaux, un à l'Ouest, l'autre à l'Est. Elle est caractérisée par un style tectonique dont l'intensité croît depuis la côte jusque dans la partie centrale où affleure le niveau structural inférieur, pour décroître brutalement dans la région subandine. Une tectonique polyphasée a donné des plis à plans axiaux verticaux ou disposés en éventail et accompagnés d'une schistosité de fracture.

Les structures les plus évidentes sont dues à des phases de compression séparées de périodes durant lesquelles les phénomènes de distension ont été importants.

La chaîne andine s'est formée symétriquement sur un vieux continent hercynien et précambrien; seule l'existence de failles inverses sur la bordure amazonienne de la Cordillère Orientale pourrait faire penser à une légère asymétrie avec déversement vers le NE.

En conclusion, la chaîne andine peut donc être considérée comme une chaîne intracratonique, située à la bordure du continent sud-américain.

Bibliographie consultée

AUDEBAUD (E.), BARD (J.P.), CAPDEVILA (R.), DALMAYRAC (B.), MAROCCO (R.), MEGARD (F.), PAREDES (J.), 1971. Le métamorphisme précambrien de basse pression des Andes orientales du Pérou. C.R. Acad. Sc., t. 273, p. 450-453.

BELLIDO (E.), 1969. Sinopsis de la Geología del Perú — Serv. Geol. Min., Bol. N° 22, p. 1—54.

COBBING (J.) Cuadrángulo de Oyon. En cours de publication par le Ser. Geol. Min. du Pérou.

COSSIO (A.), JAEN (H.), 1967. Geología de los cuadrángulos de Puemate, Chocope, Otuzco, Trujillo, Salaverry y Santa. — Serv. Geol. Min., Bol. N° 17 p. 1—141.

DALMAYRAC (B.), 1970. Mise en évidence d'une chaîne anté-ordovicienne et probablement précambrienne dans la Cordillère orientale du Pérou Central (région de Huánuco) C. R. Acad. Sc., t. 270, p. 1088-1091.

DALMAYRAC (B.), 1970. Precisiones sobre una sección típica del Paleozoico de los Andes Centrales peruanos, (quebrada de Chaupihuaranga). Comunicación Primer Congreso Latino-americano de Geología, Lima.

HAM (C.K.), HERRERA (L.Y. Jr.), 1963. Role of subandean fault system in tectonics of Eastern Peru and Ecuador. In Backbone of the Americas: a symposium. Am. Ass. Petr. Geol. Mem. 2. p. 47-61 — Tulsa USA.

KOCH (E.), 1961. Perfil tectónico a través de la Cordillera oriental y la faja subandina (Entre Tingo María, Pisqui medio y Contaya). Bol. Soc. Geol. del Perú, t. 36, p. 131-138.

KOCH (E.), BLISSENBACH (E.), 1962. Las Capas Rojas del Cretaceo superior - Terciario en la región del curso medio del río Ucayali, Oriente del Perú. Bol. Soc. Geol. del Perú, t. 39, p. 7-141.

MABIRE (B.), 1961. La serie de Capas Rojas cretáceo-terciarias en los Andes Centrales del Perú. Bol. Soc. Geol. del Perú. t. 36, p. 151-185.

MEGARD (F.), 1967. Commentaire d'une coupe schématique a travers les Andes centrales du Pérou. Rev. Geogr. Phys. et Geol. Dyn., t. IX (4), p. 335-346, Paris.

MEGARD (F.), 1968. Geología del cuadrángulo de Huancayo. Serv. Geol. Min., Bol. N° 18, p. 1-128.

MEGAR (F.), DALMAYRAC (B.), LAUBACHER (G.), MAROCCO (R.), MARTINEZ (C.), PAREDES (J.), TOMASI (P.), 1971. Cahiers ORSTOM, série géologie. Vol. III, N° 1, Paris. La chaîne hercynienne au Pérou et en Bolivie. Premiers résultats.

MISSIONS GEOLOGIQUES DE L'ORSTOM AU PEROU ET EN BOLIVIE, Caracteres généraux des Orogenes précambriens, hercyniens, et andins au Pérou et en Bolivie. Comptes-rendus du 24 e. Congres Géologique International Montréal 1972.

NEWELL (N.D.), TAFUR (I.), 1943. Ordovícico fosilífero en la Selva Oriental del Perú. Bol. Soc. Geol. del Perú, t. XIV y XV, p. 5-16.

STEINMANN (G.), 1930. Geología del Perú. Heidelberg, 448. p.

WILSON (J.J.), 1963. Cretaceous Stratigraphy of Central Peru. Bull. Amer. Ass. Petrol. Geol. vol. 47, N° 1, p. 1-34.

WILSON (J.J.), REYES (L.), 1964. Geología del cuadrángulo de Pataz. Bol. Com. Carta Geol. Nac. N° 9.

WILSON (J.J.), REYES (L.), GARAYAR (J.), 1967. Geología de los cuadrángulos de Moyobamba, Tayabamba, Huaylas, Pomabamba, Carhuaz y Huarí. Serv. Geol. Min., Bol. N° 16, p. 1-95.

Un certain nombre d'observations ont été faites au cours de tournés communes effectuées avec M.M. J.P. BARD, R. CAPDEVILA, M. MATTAUER (Faculté des Sciences, Montpellier). Grace a l'aide du C.N.R.S. (BCP 132) CAPDEVILA a entrepris une étude pétrographique et géochronologique des roches cristallines de la Cordillere Orientale; J.P. BARD, apres un voyage au Pérou, a commencé l'étude détaillée du métamorphisme des terrains précambriens.

Ce travail entre dans le cadre du programme de coopération technique qui a été établi entre l'ORSTOM et le Service Géologique et Minier du Pérou.

Je remercie vivement le Ministère des Affaires Etrangères (Service de Coopération Technique) et le "Servicio de Geología y Minería" du Pérou pour l'appui financier qui a permis la réalisation de ce travail.

COUPE GENERALE DES ANDES PERUVIENNES

Entre 9° S et 11° S

CORDILLERE ORIENTALE

CORDILLERE OCCIDENTALE

ZONE SUBANDINE

	Volcanisme acide (Pliocène ?)		Paléozoïque inférieur (Schistosité éohercynienne)
	Volcanisme tertiaire plissé		Précambrien non différencié
	Crétacé-tertiaire continental (couches rouges)		Précambrien facies Schiste vert
	Mésozoïque (Schistosité andine)		Précambrien facies amphibolite
	Mésozoïque volcano-sédimentaire côtier		Batholite et intrusifs d'âge andin (tardicrétacé)
	Paléozoïque supérieur		Intrusifs de la cordillère orientale (âge non déterminé)

B. Dalmayrac
O-R-S-T-O-M