

25, diciembre 1937



INCEMMET  
BIENES CULTURALES  
54.810 05078  
INVENTARIO 1996

GENERO SPHAEROCERAS BAYLE  
*Sphaeroceras Broggianus* nov. sp.

Lamina I; Figs. 1 y 2

*Dimensiones*

|   |        |
|---|--------|
| Diámetro .....                                    | 35 mm. |
| Altura sobre el término de la vuelta externa..... | 16 "   |
| "    en el comienzo de la vuelta externa.....     | 9 "    |
| Espesor máximo en el término de la vuelta externa | 25 "   |
| "    en el comienzo de la vuelta externa.....     | 18 "   |
| Omblogo.....                                      | 3 "    |

*Descripción.*

Concha fuertemente inflada, sin carena, ornada por más de quince tubérculos situados en el flanco-dorsal. Cada tubérculo, sobre el dorso, reúne dos o tres subcostillas, delgadas, con interespacios mayores, que pasan sobre el dorso y cuyo número es de cincuenta. Espira formada por vueltas más anchas que altas. Omblogo profundo, mínimo, de tres milímetros de

diámetros, con paredes completamente verticales. Dorso muy ancho, convexo. Flanco un poquito inflado, antes de los tubérculos, atravesado por costillas que nacen en los tubérculos dorsales. Después estos tubérculos, se convierten en prolongaciones radiales de costillas, que después, se debilitan hacia el flanco umbilical. Estas costillas están ligeramente inclinadas hacia adelante. Antes de terminar la vuelta, los tubérculos se debilitan y después desaparecen y no quedan mas que costillas que se intercalan con las sub-costillas, muy cerca del ombligo. Boca transversal, estrecha, angosta convexa.

*Relaciones.*

La *Sphaeroceras Broggianus* se parece al ejemplar joven de *Sp. Brocchii* Sow. expuesto en el atlas de BAYLE, lámina LII, figs. 3 y 4. (1) También se parece a *Sphaeroceras polyschides* WAAGEN (2), pero como este fósil tiene un ombligo, relativamente, mucho mayor, y además los tubérculos y las costillas en este son menores y menos próximas al ombligo, hay que convenir que no coincide con el *Sph. Broggianus*. La fauna argentina ofrece relaciones también con el *Sphaeroceras multiforme* GOTTSCHÉ, lámina II, fig. 8 a, b. (3); pero este *Sph. (Emileia multiformis)* aunque tiene un ombligo mínimo, sus costillas y los tubérculos son completamente diferentes.

*Edad.*—Bajociano (Oolítico Inferior).

*Localidad.*—Este fósil fué recogido por el señor Teobaldo J. Pinzás de un lugar situado a 5 km. del pueblo de Huaylas, algunas centenas de metros encima del camino que conduce al de Mato.

*Dedicación.*—Esta nueva especie la dedico a mi discípulo Ing°. Jorge A. Broggi, profesor de Geología de la Escuela de Ingenieros y Secretario de la Sociedad Geológica del Perú, por su constante dedicación a la ciencia.


*Observaciones.*—El afloramiento jurásico más próximo a Caraz, es la quebrada Huayabamba, distrito de Piscobamba, donde se encontró *Perisphinctes* aff. *densistriatus* STEUR, cuya edad es Oolítico Superior.

C. I. LISSON.

- 
- (1) E. Bayle.—Expl. de la Carte Geologique de la France.—Atlas—Fossiles principaux des terrains.—1878.
  - (2) G. Steinmann.—Geología del Perú —pág. 77; fig. 85 —1930.
  - (3) C. Gottsche. — Ueber Jurassische Versteinerrungen a. d. Argentinische.—1878.

*Sphaeroceras Broggianus* nov. sp.

Fig. N.º 1



8

Fig. N.º 2



8